

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ  
ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡ. ΣΠ. ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ARISTOTELIAN UNIVERSITY OF THESSALONIKI

SCIENTIFIC ANNALS OF  
THE SCHOOL OF AGRICULTURE AND FORESTRY  
SECTION OF FORESTRY

DEDICATED TO  
DR. CHR. SP. MOULOPOULOS EMERITUS PROFESSOR



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΩΡΙΚΗΣ

Δ. Σ. ΚΑΪΛΙΔΗ  
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΔΡΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

LABORATORY OF FOREST PROTECTION

D. S. KAILIDIS  
Professor

THE INSECTS OF OAKS IN GREECE

ΤΟΜΟΣ ΚΑ' - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
VOL. ΚΑ' - ANNEX

1981

Ἄρθ. 4  
No 4

ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΔΡΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ὑπό

Δ. Σ. ΚΑΪΛΙΔΗ

Καθηγητῆ Πανεπιστημίου

Ο συγγραφέας και η Γεώργεβιτς το 1974 (Καϊλίδης, Γεώργεβιτς 1974) ανέφεραν 93 είδη εντόμων, που προσβάλλουν τις δρυς στην Ελλάδα, ενώ τα έντομα που προσβάλλουν τις δρυς στην Ευρώπη είναι μερικές εκατοντάδες (Patočka 1980, Schwenke et al. 1972, 1974, 1978, Zlatanov 1971). Ήδη στην εργασία του αυτή ο συγγραφέας, που στο μεταξύ άρχισε να μελετάει τα έντομα της δρυός, αναφέρει περισσότερα από 50 νέα προσδιορισθέντα έντομα, ενώ έχει για προσδιορισμό μερικές ακόμη δεκάδες. Μελλοντικά, μετά 3-4 χρόνια, πιστεύουμε ότι θα γράψουμε ιδιαίτερη μονογραφία για τα έντομα της δρυός στην Ελλάδα.

*Έντομα φύλλων*

- Melolontha farinosa* Kr. (Scarab.). Στη δρυ, λεύκη και λοιπά πλατύφυλλα στη Θεσσαλία, Μακεδονία. Ο Muche (1968) το αναφέρει στην Πελοπόννησο.
- Cercopis sanguinea* Geoffr. (Cercopidae). Σε φύλλα δρυός, επίσης σε λεύκη κ.λ.π.
- Aceria ilicis* Gan. (Erioph.). Σε *Q. ilex* στην Όσσα και μακεδονική δρυ στην Κοζάνη.
- Lachnus longipes* Duf. (Aphid.). Άρκετά συνηθισμένο.
- Phylloxera quercina* Ferr. (Phylloxer.). Σε *Q. cerris* και *Q. comferta*.
- Vanessa polychloros* L. (Nymphalidae). Σε δρυ και λεύκη στο Σταυρό, Χαλκιδικής, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
- Galerucella luteola* Müll. (Chrysom.). (Πελεκιάσης 1962). Έμεις το έντομο το βρήκαμε μόνο σε φτελιά.
- Haltica quercetorum* Foudr. (Chrysomel.). Σε δρυς στη Ζάκα Γρεβενών.
- Melasoma aenea* L. (Chrysom.). Σε *Q. comferta* στο Χολομώντα.
- Agelastica alni* L. (Chrysom.). Στη μακεδονική δρυ στην Κοζάνη.
- Cryptocephalus cordiger* L. (Chrysom.). Στη μακεδονική δρυ στην Κοζάνη.
- » sp. » » »
- » sp. » » »
- Anomala vitis* F. (Scarabeidae). Σε δρυς, λεύκες, φιλόρες, *Sambucus nigra* άφθονότατο στη Μακεδονία.

- Polydrosus mollis* Sinoem. (Curculion.). Σε φύλλα δρυών, λευκών κ.λ.π.  
*Polydrosus sericeus* Schall. (Curculion.). Σε φύλλα δρυών, λευκών κ.λ.π.  
*Calicoa limanica* Ratz. (Υμεν., Tenthred.). Σε μικρούς αριθμούς στη Μακεδονία.  
*Periclista albida* Kl (Tenthed). Σε μικρούς αριθμούς στη Μακεδονία.  
*Emphytus baccatus* Gmel. (Tenthred.). Σε μικρούς αριθμούς στη Μακεδονία.  
*Lymantria dispar* L. (Lep., Lymantriidae). Συνηθέστατο σε όλη τη χώρα. Προσβάλλει περισσότερο πουρνάρια παρά τα άλλα είδη δρυών.  
*Euproctis chrysoorrhoea* L. (Lep., Lymantriidae). Συνηθέστατο σε φυλλοβόλους δρύς στη Μακεδονία, επίσης σε πουρνάρι στη Λεβαδειά, σε *Arbutus* στην Κάρυστο, στην 'Αλεξανδρούπολη, τοπικά αναπτύσσει επιδημίες. Ο Πελεκάσης (1962) το αναφέρει σε *Cyttonia*, *Malus*, *Pirus*.  
*Malacosoma neustria* L. (Lep., Lasiocampidae). Σε φυλλοβόλους δρύς σε όλη τη χώρα, επίσης στη λεύκη, σκλήθρο, *Arbutus*, άγριοαπιδιά.  
*Choristoneura sorbiana* Hb. (Tortric.). Σπάνιο στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Phigalia pedaria* F. (Lep., Geometr.). Σε μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Ennomos quercinaria* Hfn. (Lep., Geometr.). Στη Μακεδονία σπάνιο.  
*Anacampsis disquei* Meess (Lep., Gelechiidae). Περιτυλίγει κάθετα τα φύλλα των δρυών. Κοινό στη Μακεδονία.  
*Aglia tau* L. (Bomb.). Στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Thaumetopoea processionea* L. (Thaumetop.). Σε πουρνάρι στον Πόρο (Γεώργεβιτς 1966).  
*Lasiocampa quercus* L. (Lasiocamp.). Στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη, επίσης σε *Quercus* sp. στη Λάρισα.  
*Archips* (=Cacoecia) *xylosteana* L. (Tortric.). Περιστρέφει τα φύλλα της δρύς. Σε όλη τη χώρα.  
*Tortrix viridana* L. (Tortric.). Σε φυλλοβόλους δρύς στη Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Φουρνά, Λάρισα.  
*Lithocolletis* sp. (Tineidae). Σε *Q. coccifera* στην Πάρνηθα (1970 προσβολή φύλλων 70-80%).  
*Phalera bucephala* L. (Notodon.). Σε φυλλοβόλους δρύς και στις λεύκες στη Μακεδονία, σε *Acer* στο Περτούλι.  
*Hypophila bicolorana* Fuessl. (Noctuidae). Σπάνιο στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Orthosia stabilis* Den. et Schif. (Noctuidae). Σε χνοώδη δρύ στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης και σε μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Orthosia* sp. Στο Φίλυρο και Χολομώντα.  
*Catocala paranympa* L. (Noctuid.). Σε πουρνάρι στη Λάρισα.

- Acrobasis tumidella* Zinck. (=zellerri) (Lep., Phycitidae). Με νήματα μαζεύει πολλά φύλλα. Σε όλη τη Μακεδονία σε *Q. pubescens*, *comferta*, *macedonica*.  
*Acrobasis sodalella* Zell. Συχνό στο Χολομώντα.  
*Peridea anceps* (Goeze). (Lep., Notod.). Ωραίες, μεγάλες πράσινες κάμπιες στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Dicycla oo* L. (Lep., Noctuidae). Σε φυλλοβόλους δρύς στην 'Ηλεία Πελοποννήσου, Μακεδονία.  
*Rhynchaenus quercus* L. (Curculion.). Υπονομευτής σε φυλλοβόλους δρύς στη Μακεδονία.  
*Rhynchaenus pilosus* F. (=ilicis F.). Κοινό στη Μακεδονία σε μακεδονική δρύ, χνοώδη, *comferta*.  
*Tischeria companella* Hb. (Tischer.). Υπονομευτής φύλλων στη Μακεδονία.  
*Tischeria ekeblade* Bjerk. Σε *Q. comferta*, *Q. pubescens* στη Μακεδονία.  
*Lithocolletis quercifoliella* Z. (Tineoid.). Στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Lithocolletis roboris* Zll. (Tineoid.). Στη μακεδονική δρύ, χνοώδη δρύ στη Μακεδονία.  
*Stigmella ruficapitella* Haw. (Lep., Stigmel.). Στοές στα φύλλα.  
 » *atricapitella* Haw.  
*Dyseriocrania subpurpurella* Haw [=fastuosella Zll. (Lep., Eriocran.)]. Υποσκάπτει στα φύλλα πλατιά στοά, με περιττώματα που φαίνονται.  
*Acrocercops brongniardellum* F. (Gracil.). Υπονομευτής φύλλων.  
*Attelabus nitens* Scop. (Curculion.). Σε *Q. pubescens*, *Q. comferta*, *Q. macedonica*, στην 'Αττική, Θεσσαλονίκη, Χολομώντα, Κοζάνη.  
*Macrodiplosis volvens* Kieffer (Cecidom.). Σε *Q. comferta*, χνοώδη στη Μακεδονία.  
*Macrodiplosis dryobia* F. Loew. (Cecidom.). Σε *comferta*, χνοώδη στη Μακεδονία.  
*Oncomera flavicans* Fairm. (Oedemeridae). Σε δρύ, γαῦρο, πλατύφυλλα στην 'Αττική, Πάρνηθα, Πελοπόννησο, Εύβοια (Oertzen 1886).  
*Cantharis tristis* F. (Canthar.). Στα δάση δρύς Γρεβενών 16.5.1960. Κατά Beffa (1964) είναι βλαπτικό των λουλουδιών φύλλων όπωροφόρων.  
*Tettigonia viridissima* L. (Orth., Phasgon.). Μεγάλη πράσινη ακρίδα. Σε μικρούς αριθμούς.  
*Metrioptera sepium* Yers. (Orth., Tettigon.). Μικρή γκριζωπή άπτερη ακρίδα. Κοντά στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Leptophyes punctatissima* Bosc. (Orth. Tettigon.). Μικρή πράσινη πρακτικά άπτερη ακρίδα. Κοινή στην Κοζάνη και Χολομώντα.

## Μυζητικά φλοιού

- Aspidiotus ostreiformis* Curtis (Coccid.). Στο Πήλιο σε *Q. pedunculata* (Koroneos 1934).  
*Aspidiotus minimus* (Leon.) Ckll. (Coccid.). Στο Πήλιο σε *Q. ilex* σπάνιο και πουρνάρι κοινό (Koroneos 1934).  
*Targionia vitis* Sign. (Coccid.). Στο Πήλιο σε δρύ (Koroneos 1934).  
*Asterolecanium variolosum* Ratz. (Asterol.). Έμεις σε *comferta* στο Χολομώντα και σε πουρνάρι ό Πελεκάσης (1962).  
*Kermococcus roburis* Fourcr. (Hemipt., Kermoc.). Συνηθισμένο στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Parthenolecanium rufulum* (Kll. (Hemipt., Lecan.). Σε λεπτά κλαδιά σε μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.

## Έντομα φλοιού-ξύλου

- Cicadetta montana* Scop. (Cicad.). Σε πουρνάρι στην Άνδρο.  
*Cerambyx cerdo* L. (Ceram.). Στη Χαλκιδική, Χορτιάτη, Πιέρια. Τοπικά επικίνδυνο ξυλοφάγο.  
*Cerambyx Scopoli* Füssl. (Ceram.). Στο Καρπενήσι, Ταύγετο, Εύβοια χωρίς ξενιστή (Oertzen 1886). Έμεις τό βρήκαμε τόν Ιούλιο τέλεια στο δρυοδάσος του Χολομώντα.  
*Lucanus cervus* L. (Lucan.). Στο Χορτιάτη, Χαλκιδική. Σπάνιο, χωρίς σημασία.  
*Lucanus cervus* (L.) var. *pentaphyllus* (Reische) (Lucanidae). Πελεκάσης (1962).  
*Anaesthesea testacea* Fabr. (Ceram.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Morimus asper* Sulz. (Ceram.). Σε δρύ στον Τυμφρηστό και Κούμανη Ήλείας.  
*Morimus funereus* Mul. (Ceram.). Τέλεια έντομα ελεύθερα βαδίζουν στο έδαφος στην Καλλιπέυκη Όλύμπου, επίσης Μάιο-Ιούλιο στο δρυοδάσος Χολομώντα.  
*Dorcus parallelepipedus* L. (Lucanidae). Τέλεια σπάνια σε όλη τή χώρα. Προνύμφες σε ξύλο *Q. conferta* στην Ίστιαία Εύβοιας.  
*Dicerca alni* Fisch. (Buprest.). Στη Μακεδονία, σπάνιο.  
*Coraebus Oertzeni* Ganglb. (Buprest.). Σε *Q. robur* (Oertzen 1886).  
*Coraebus fasciatus* Villens (Buprest.). Στη Χαλκιδική, Ροδόπη. Κοινό στο Χολομώντα Χαλκιδικής.  
*Agrilus biguttatus* F. (Buprest.). Στην περιοχή Σερρών σε δρύ και λεύκες.  
*Agrilus laticornis* Ill. Σε μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.

- Agrilus viridis* L. Στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Stenolechia gemella* L. (Tineidae). Διανοίγει στοές στους βλαστούς (Πελεκάσης 1962).  
*Zeuzera pyrina* L. (Cossidae). Στην Όσσα σε δρύς και καστανιά, στο πάρκο Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης σε φτελιά. Έπίσης στο Χορτιάτη.  
*Platypus cylindrus* Fabr. (Platypod.). Στη Ροδόπη.  
*Xylotrechus arvicola* Oliv. (Ceram.). Στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.  
*Xylotrechus rusticus* L. (Ceram.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Strangalia maculata* Poda (Ceram.). Κοινό στο Χολομώντα.  
*Xylopertha retusa* (Oliv.) (Bostrych.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Bostrychus capucinus* L. (Bostrych.). Άκμαία σε δάση δρυός στη Χαλκιδική, Γρεβενά, Ροδόπη. Έπίσης σε πατώματα δρυός σπιτιών.  
*Sinoxylon sexdentatum* (Oliv.) (Bostrych.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Clytus (=Plagionotus) arcuatus* L. (Ceram.). Στο Χορτιάτη, Χαλκιδική, Θεσσαλία, Κούμανη Ήλείας.  
*Clytus arietis* L. Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Xyloterus domesticus* L. (Scolyt.). Εύβοια (Oertzen 1886).  
*Stenopterus* sp. (Ceram.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Clytus lama* Muls. (Ceram.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Clytus semi-punctatus* Fabr. (Ceram.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Clytus (=Echinocerus) floralis* Pall. (Ceram.). Σε δάσος δρυός στο Νότιο Όλυμπο. Έντομο δρυός;  
*Isotomus (=Caloclytus) speciosus* Shn. (Ceram.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Phymatodes lividum* Ross. (Ceram.). Κοινό σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Chloroporus (=Clytanthus) figuratus* Scop. (Ceram.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Exocentrus punctipennis* Muls. (Ceram.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Exocentrus adpersus* Muls. (Ceram.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Anthaxia* sp. (Buprest.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Anthaxia hungarica* Sop. (Buprest.). Σε άρια στη Χαλκιδική.  
*Xyleborus monographus* Fabr. (Scolyt.). Σε δρύ στη Χαλκιδική.  
*Ptosima* sp. (Buprest.). Τέλειο στη μακεδονική δρύ στην Κοζάνη.  
*Lyctus brunneus* Steph. (Lyctidae). Σε ξύλο δρυός (παριέτων).  
*Lyctus linearis* Goeze. Σε παρκετόξυλα δρυός.  
*Stenopterus* sp. (Ceram.). Από τὰ τρία είδη *Stenopterus* τής Εύρώπης μοιάζει με τό *St. flavicornis*, έχει όμως και αρκετές διαφορές. Σε άρια στη Χαλκιδική.

## "Ογκοί (Κηρίδες)

- Contarinia subulifex* Kffr. (Cynip.). Σε μακεδονική δρυ στην Κοζάνη.  
*Cynips coriaria* Hart. (Cynip.). Στην Ίστιαία Εύβοιας.  
*Cynips* (= *Diplolepis*) *stefanii* Kieff. (Cynip.). "Ογκοί κωνοειδείς, σπάνιο.  
*Cynips divisa* Htg. (Cynip.). Στη Θράκη και Μακεδονία.  
*Cynips gallae tinctoriae* Ol. (Cynip.). Σε *Q. aegilops* στη Θράκη.  
*Cynips insana* Westw. (Cynip.). Με μεγάλους λαμπερούς όγκους. Συνηθισμένο σε *Q. conferta*.  
*Cynips tomentosa* Trotter. (Cynip.). Σε πολλά μέρη Ελλάδας. "Οχι όμως άφθονο.  
*Cynips lignicola* Htg. (Cynip.). "Ογκοί στα μάτια, σπάνιο.  
*Cynips quercus tozae* Bosc. (Cynip.). Στη Βαρετάδα Αμφιλοχίας σε χνοώδη πολύ σημαντικό. Σε πολλά μέρη Ελλάδας σε *Q. conferta*, *Q. pubescens*.  
*Cynips quercus folii* L. (Cynip.). Σε πολλά μέρη Ελλάδας σε *Q. petraea*.  
*Cynips caput-medusae* Hart. (Cynip.). Με μεγάλους χαρακτηριστικούς σάν άγκάθια όγκους. Σε *Q. conferta* στη Θράκη και Φουρνά, σε *Q. pubescens* στη Βαρετάδα Αμφιλοχίας.  
*Cynips mitrata* Magr. (Cynip.). Σπάνιο, διάσπαρτο στη Β. Ελλάδα.  
*Cynips salicis* Burs. (Cynip.). Σε *Q. aegilops*.  
*Biorrhiza pallida* Oliv. (Cynip.). Συνηθέστατο σε όλη τη χώρα σε *petraea* και *Q. conferta*.  
*Andricus conglomerata* Giv. Σε μακεδονική δρυ στην Κοζάνη.  
*Andricus currator* Htg. Στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, σπάνιο.  
*Andricus Panteli* Kieff. (Cynip.). Σπάνιο στη Β. Ελλάδα.  
*Andricus Kollari* Hrt. (Cyn.). Ξυλώδεις όγκοι στη μακεδονική δρυ στην Κοζάνη.  
*Andricus inflator* Hart. (Cynip.). Σχετικά σπάνιο σε *Q. petraea*.  
*Andricus quercus radiceis* F. (Cynip.). Σε *Q. conferta* και *Q. macedonica*.  
 » » *folii* L. Στη Μακεδονία σε χνοώδη.  
*Andricus lucidus* Oliv. (Cynip.). (Πελεκάσης 1962).  
*Neuroterus lanuginosus* Gir. (Cynip.). Σε *Q. cerris* διάσπαρτο σε όλη τη χώρα, επίσης στη μακεδονική δρυ στην Κοζάνη.  
*Andricus solitarius* Fonsc. Σε χνοώδη στο Χολομώντα.  
*Andricus testaceipes* Harting. Σε μακεδονική δρυ στην Κοζάνη.  
*Andricus* (= *Cynips*) *truncicola* (Giraud.). Σε χνοώδη, σπάνιο.  
*Neuroterus quercus-baccarum* L. (Cynip.). "Ογκούς διαφόρων μορφών πάνω σε φύλλα και άνθη σε *conferta* και χνοώδη στη Μακεδονία. Πολύ κοινό στο Χολομώντα.  
*Neuroterus numismalis* Ol. (Cynip.). Κοινό στη Μακεδονία.

- Neuroterus fumipennis* Htg. (*tricolor* Htg.). (Cynip.). Κοινό στη Μακεδονία.  
*Neuroterus lenticularis* Oliv. (Cynip.). Συνηθισμένο σε διάφορες περιοχές της χώρας.  
*Neuroterus laeviusculus* Schenck (= *albifex* Schenck) (Cynip.). (Πελεκάσης 1962).  
*Synophrus politus* Htg. (Cynip.). Σε *Q. conferta*.

## "Εντομα καρπών

- Carpocapsa splendana* Hb. (Lep., Tortricidae). Κοινό στα βαλανίδια, στα πουρνάρια περιοχής Θεσσαλονίκης.  
*Curculio* (= *Balaninus*) *elephas* Gyll. (Curculion.). Υποσκάπτει βαλανίδια στις δρυς στη Μακεδονία. Είναι πολύ επικίνδυνο στα κάστανα στη Χαλκιδική και Όσσα.  
*Curculio* (= *Balaninus*) *glandium* Mrsh. (Curculion.). Υποσκάπτει βαλανίδια. Στην Ήλεια στις 6.5.1981 πολλά. Στη Μακεδονία σπανιότερο.  
*Calandra granaria* L. (Curculion.). Σε βαλανίδια δρυών σε αποθήκες στα Χανιά Κρήτης.  
*Calandra oryzae* L. (Curculion.). "Ομοια με το προηγούμενο.

## "Αρπακτικά

- Calosoma sycophanta* L. (Carabidae). Συνηθισμένο σε όλη τη χώρα.  
 » *inquisitor* L. Λιγότερο συνηθισμένο από το προηγούμενο.  
*Rhaphidia notata* F. (Neuroptera). Στη μακεδονική δρυ στην Κοζάνη.

## THE INSECTS OF OAKS IN GREECE

By  
D. S. KAILIDIS

### SUMMARY

During 1974 Kailidis and Georgevits (1974) referred 93 insect species which attack *Quercus* spp. in Greece. In this paper the author adds 50 and more insect species which attack oaks in Greece and mostly in Macedonia.

### ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Καιλίδης, Δ., Ρ. Γεώργεβιτς. 1974. Τὰ δασικά έντομα τής Ελλάδος. Παν/μιο Θεσ/νίκης, Έπετ. Γεωπ. Δασολ. Σχολής. 16:233-271.
- Koroneos, J. 1934. Les Coccidae de la Grèce surtout du Pilon. Athènes.
- Muche, W. H. 1958. Non biologischen gleichgewicht in der Bergwäldern des Peloponnes. Anz. f. Schadl. 31:141.
- Patocka, J. 1980. Die Raupen und Puppen der Eichenschmetterlinge Mitteleuropas. Parey. Hamburg, Berlin. S. 1-188.
- Πελεκάσης, Κ.Ε.Α. 1962. Κατάλογος τών σπουδαιότερων έντόμων και άλλων ζώων σημειωθέντων ως επιβλαβών εις τήν Έλληνική γεωργία κατά τήν τελευταία τριακονταετία. Χρον. Μπεν. Φυτ. Ένστ. 5(1):5-104.
- Zlatanov, St. 1971. Insektenschädlinge der Eiche in Bulgarien. Bulgar. Akad. der Wissenschaften. Sofia. S. 1-249.
- Schwenke, W. et al. 1971. Die Forstschädlinge Europas. 1. Band. Parey. Hamburg, Berlin. S. 1-464.
- Schwenke, W. et al. 1974. Die Forstschädlinge Europas. 2. Band. Parey. Hamburg, Berlin. S. 1-500.
- Schwenke, W. et al. 1978. Die Forstschädlinge Europas. 3. Band. Parey. Hamburg, Berlin. S. 1-467.